



CHARLES A. SMITH, DDS & KOLLEGEN

Spezialisten für Ästhetische Zahnheilkunde

ANLEITUNG/VERHALTENSREGEL: KRONE / INLAY / ONLAY-VORBEREITUNG

- Nach der Vorbereitung von Krone / Inlay / Onlay treten in der Regel nur geringe oder keine Beschwerden auf.

*Wir glauben an vorbeugende Schmerzkontrolle. Bevor Schmerzen oder Beschwerden auftreten, empfehlen wir die Einnahme von Schmerzmitteln:

Erwachsene: 800mg Ibuprofen 4x täglich
ODER 1000mg Paracetamol

Kinder: Kinder(flüssig) Paracetamol

* Sofern keine medizinischen Indizien für die Verwendung dieser Medikamente vorliegt.

- Die Betäubung hält normalerweise zwischen 1-2 Stunden an. Achten Sie darauf, während dieser Zeit nicht auf Ihre Zunge oder Wange zu beißen.
- Sie sollten in der Lage sein, wie gewohnt zu essen während die provisorische Krone / Inlay / Onlay im Mund ist. Versuchen Sie jedoch, sehr klebrige Lebensmittel, Eis oder Kaugummi zu vermeiden. Kauen Sie auf der anderen Seite Ihres Mundes.
- Im Falle das sich eine temporäre Krone/ Inlay / Onlay löst, ist es wichtig, dass Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Sie können Vaseline oder Haftcreme zur Überbrückung verwenden. Selbst wenn die temporäre Krone / Inlay / Onlay nicht unangenehm ist, kann sich der Zahn leicht bewegen und verhindern, dass die endgültige Krone/ Inlay / Onlay richtig sitzt.
- Vermeiden Sie nach Möglichkeit Zahnseide um die provisorische Krone Inlay / Onlay nicht zu lösen. 3x täglich, 3 Minuten Zähne putzen.
- In der Regel benötigt das Labor etwa zwei Wochen, um eine Krone / Inlay / Onlay herzustellen und an uns zurückzusenden. Bitte wenden Sie sich an unsere Praxis, falls Sie Fragen oder Probleme mit Ihrer provisorische Krone / Inlay / Onlay haben.

Römerstr. 1 • 69115 Heidelberg • 06221-6516090