



CHARLES A. SMITH, DDS & KOLLEGEN

Spezialisten für Ästhetische Zahnheilkunde

ANLEITUNG/ VERHALTENSREGEL:

Implantate

- Unmittelbar nach der Implantation nehmen Sie 600mg Ibuprofen und 1000mg Paracetamol ein.
- Nehmen Sie für die nächsten 3 Tage, alle 6-8 Stunden 400 mg Ibuprofen ein. Kauen Sie nicht an der Implantationsstelle, es sei denn, Sie essen sehr weiche Speisen. Auf diese Implantationsstelle dürfen Sie 4 Wochen lang nicht kauen.
- Das Kauen auf dem Implantat während des Heilungsprozesses kann zum Versagen des Implantats führen! - Wenn Sie eine elektrische Zahnbürste haben, schalten Sie die Vibration ab, während Sie um das Implantat bürsten. Sie müssen dies 4 Wochen lang tun. - Vermeiden Sie 8 Wochen lang die Verwendung einer Munddusche um die Implantationsstelle herum. – Benutzen Sie Zahnseide floss an der Implantationsstelle. - Nicht rauchen.
- Drücken Sie nicht mit dem Finger auf das Implantat und stören Sie das Implantat nicht auf andere Weise als durch Bürsten und Zahnseide.
- Zahnseide regelmäßig benutzen: Führen Sie die **Zahnseide** mit einer sanften Hin- und Herbewegung in den Zahnzwischenraum ein und ziehen es sanft zur Seite wieder raus.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Zahnarztpraxis oder senden Sie eine E-Mail an uns: info@heidelbergzahnmedizin.com